

Journée de formation d'automne des Correspondants
en Hygiène Hospitalière
Jeudi 16 novembre 2017

FOCUS GRIPPE

Dr Agathe MATTEI, CHU SE
Vanessa JOUANADE, IDE
ICLN

VACCINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE /ÉTUDIANTS

Obligatoires : diphtérie, tétanos,
polio, hépatite B
(typhoïde – techniciens laboratoire)

Recommandées : grippe, coqueluche,
rougeole, varicelle



http://vaccination-info-service.fr/var/vis/storage/original/application/download/calendrier_des_vaccinations_2017.pdf

Pour info : Grippe 2016-2017


Pendant les 10 semaines de l'épidémie, la part d'excès de mortalité attribuable à la grippe a été estimée à **14 400 décès** dont plus de 90% chez les personnes de 75 ans et plus.

<http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance>

GRIPPE

– Rappels

- orthomyxoviridae, influenzavirus
- Virus enveloppé à ARN segmenté
- 2 sous-types fonction de 2 protéines : hémagglutinine H et neuraminidase N
- 3 types : A, B et C



– Incubation : 1 à 7 jour(s)

– Contagiosité : max 12 jours (24 à 48h avant le début des signes + période symptomatique)

– Transmission

- Voie gouttelettes essentiellement → muqueuses
- Par contact (surfaces souillées)

– Symptômes : apparition brutale


- Forte fièvre, myalgies, céphalée, toux sèche, rhinorrhée...
- Risque de complications pouvant aller jusqu'au décès (pneumopathie)...

VACCINATION

- Vaccin inactivé, fragmenté
 - Sans adjuvant
 - Composition actualisée annuellement / surveillance épidémiologique
 - Trivalent : pour la saison 2017-2018
 - souche A(H1N1)pdm09 analogue à A/Michigan/45/2015 (H1N1)
 - souche A(H3N2) analogue à A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)
 - souche B de type Brisbane analogue à B/Brisbane/60/2008-like virus
 - Recommandé pour les personnes à risque et pour celles en contact avec ces dernières
 - personnes âgées de 65 ans et plus
 - personnes (adultes et enfants) atteintes de certaines maladies chroniques
 - femmes enceintes
 - personnes obèses avec un indice de masse corporelle ≥ 40 Kg/m²
 - personnes séjournant dans un établissement de santé de soins de suite ou dans un établissement médico-social d'hébergement quel que soit leur âge.
 - professionnels de santé ou tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque
 - entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe grave : personnes résidants sous le même toit, la nourrice et tous les contacts réguliers du nourrisson ;
 - personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et le personnel de l'industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs.
- Le vaccin antigrippal présente également un bénéfice pour toutes les personnes désirant éviter la gêne personnelle ou professionnelle occasionnée par la grippe.

EN PRATIQUE

- Devant toute personne manifestant des signes respiratoires,
 - Lui proposer le port du masque chirurgical
 - Lui expliciter comment le porter
- Si hospitalisation : PCH de type gouttelettes
 - Pour le soignant, port du masque chirurgical dès l'entrée dans la chambre
 - Pour le patient, port du masque chirurgical si sortie de la chambre
 - Usage unique, filière DAOM
 - Hygiène des mains après élimination
 - Durée maximum d'utilisation 3h, ne pas le manipuler
- Lors de manœuvres invasives (fibroscopie, aspiration bronchique, kinésithérapie respiratoire...), les soignants portent un APR.



MERCI DE VOTRE ATTENTION