

Journée Inter-Établissements
15 Novembre 2018



Vous avez dit gale ?

Quizz

Catie Crépiat
Cadre en hygiène

Centre Hospitalier du Forez

Isabelle Raberin
Infirmière Hygiéniste

Centre hospitalier Le Corbusier
Centre Hospitalier Georges Claudinon

1-Quand suspecter une gale ?

1. Prurit
2. Lésions de grattage
3. Lésions localisées
systématiquement sur le cuir
chevelu
4. Prurit généralisé
5. Perte d'appétit
6. Agitation

1-Quand suspecter une gale ?

1. Prurit

2. Lésions de grattage

3. Lésions localisées
systématiquement sur le cuir
chevelu

4. Prurit généralisé

5. Perte d'appétit

6. Agitation

2-Dans le cadre d'une suspicion de gale, quand doit-on mettre en place les mesures de protection ?

1. Des les premiers signes de grattage
2. Uniquement a la confirmation du diagnostic
3. A l'apparition des sillons
4. A l'apparition des vésicules

2-Dans le cadre d'une suspicion de gale, quand doit-on mettre en place les mesures de protection ?

1. Des les premiers signes de grattage

2. Uniquement a la confirmation du diagnostic

3. A l'apparition des sillons

4. A l'apparition des vésicules

3-Quelles sont les mesures a mettre en place ?

1. « Isolement » de la patiente
2. Port uniquement des tabliers de protection a UU
3. Port de surblouse à manches longues
4. Port de gants a UU uniquement au moment des soins souillants
5. Port de gants a UU des l'entrée de la chambre

3-Quelles sont les mesures a mettre en place ?

1. « Isolement » de la patiente
2. Port uniquement des tabliers de protection a UU
3. Port de surblouse à manches longues
4. Port de gants a UU uniquement au moment des soins souillants
5. Port de gants a UU des l'entrée de la chambre

4- Qui sont les contacts ?

1. Personnel réalisant des soins rapprochés à évaluer au cas par cas
2. Patients / résidents ayant eu des contacts cutanés directs prolonges, répétés.
3. Entourage familial ayant eu un contact direct, rapproché, prolonge avec le cas

4- Qui sont les contacts ?

1. Personnel réalisant des soins rapprochés à évaluer au cas par cas
2. Patients / résidents ayant eu des contacts cutanés directs prolonges, répétés.
3. Entourage familial ayant eu un contact direct, rapproché, prolonge avec le cas

5 – traitement du linge

- 1 – Le linge est enfermé dans un sac avec un produit spécifique pendant 24 heures
- 2 - le linge lavé à 60° C ou plus n'a pas besoin de traitement spécifique
- 3 – Si le linge ne peut pas être lavé, je l'enferme au moins 3 jours dans un sac hermétique

5 – traitement du linge

- 1 – Le linge est enfermé dans un sac avec un produit spécifique pendant 24 heures
- 2 - le linge lavé à 60° C ou plus n'a pas besoin de traitement spécifique
- 3 – Si le linge ne peut pas être lavé, je l'enferme au moins 3 jours dans un sac hermétique