

Point épidémiologique

Infections respiratoires aiguës



notre CHU
votre santé



Formation GEPILS des correspondants
en hygiène GHT 14/10/2025




* Méthodologie en annexe. Antilles : niveau d'alerte pour S39. ** Données non disponibles pour Mayotte.
Source : ¹ réseau OSCOUR®, ² SOS Médecins, ³ réseau Sentinelles


Bronchiolite: VRS principal virus responsable mais d'autres virus peuvent donner des bronchiolites (rhinovirus, virus para-influenza, métapneumovirus...)

Surveillance virologique

D'après les données virologiques appartenant au réseau de laboratoires de ville RELAB, la circulation du SARS-CoV-2 est assez élevée depuis la semaine S36-2025 avec un taux de positivité de 29%, presque autant que la saison passée à la même période, mais semble s'orienter à la baisse. La circulation des autres virus (VRS et grippe) est très faible.


Figure 4. Taux de positivité (%) des prélèvements réalisés en laboratoires de ville pour différents virus respiratoires, Auvergne-Rhône-Alpes






Sous Variant Omicron majoritaire actuel :
XFG très proche antigéniquement de la
souche vaccinale LP8.1

Part des IRA basses parmi les passages aux urgences



Source : réseau OSCOUR®


Part des IRA basses parmi les passages aux urgences, selon le niveau d'intensité pour cet indicateur*




Source : réseau OSCOUR®. * Méthodologie en [annexe](#)

Part de la COVID-19/suspicion de COVID-19 et de la grippe/syndrome grippal (tous âges) et part de la bronchiolite (chez les moins de 1 an)

Passages aux urgences




Hospitalisations après passage



Source : réseau OSCOUR®

Source : réseau OSCOUR®

Figure 3. Nombre d'épisodes de cas groupés d'IRA dans les établissements médico-sociaux



S39 et S40 : données non consolidées

Démarrage campagne de vaccination

VACCINATION
GRIPPE
✓ TOUS CONCERNÉS

+ vaccin
COVID-19

Conception : Agence Régionale de Santé Grand Est - Illustration : © John Vintagay - Adobe Stock.com

www.grand-est.ars.sante.fr
 ① ARSGrandEst
 ② ARS_Grand_Est

VACCINATION
INFO SERVICE.FR
Le site de référence qui répond à vos questions.

Depuis le 16/09, **50 cas de légionellose** dans le secteur d'Albertville (Savoie) (2 décès) investigations toujours en cours

Infection pulmonaire provoquée par des bactéries présentes dans l'eau : les légionelles.

Contamination par voie respiratoire, *via* l'inhalation de gouttelettes d'eau contaminées

sources de contamination les + fréquentes: réseaux d'eau chaude sanitaire domestique ou publics (douches, douchettes, bains à remous ou à jets, spas, jacuzzis, etc)

+ rarement : tours aéroréfrigérantes, fontaines décoratives, brumisateurs, arrosage et manipulation de composts.

N'est pas contagieuse ; ne se transmet pas de personne à personne.

Boire de l'eau ne présente pas de risque de contamination, seule l'inhalation via le système respiratoire présente un risque.

Symptômes en moyenne entre 2 et 10 jours après l'exposition à la bactérie

Au début toux importante et forte fièvre, voire des troubles gastro-intestinaux pour les personnes âgées

La légionellose affecte essentiellement les adultes et plus particulièrement les personnes vulnérables :

personnes âgées, fumeurs, personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques, diabète, maladies ou traitements affaiblissant les défenses immunitaires.

Ensemble,
soigner, former, chercher et innover pour la santé de tous.



Humanité - Responsabilité - Solidarité - Engagement